

# LE DR BODERIOU VOUS CONSEILLE

## LA STERILISATION

### LES DIFFERENTS TYPES DE STERILISATION

Il existe des méthodes médicales (injections, pilules, implants...) et des méthodes chirurgicales. Les chirurgies les plus pratiquées sont :

L'ovariectomie : ablation des ovaires.

L'ovariohystérectomie : ablation des ovaires et de l'utérus.

La castration : ablation des testicules.

### LA STERILISATION DE LA CHATTE

L'ovariectomie est la méthode de choix pour les chattes jeunes lorsque l'on souhaite une solution définitive. Elle est possible dès l'âge de 6 mois. L'hospitalisation est de courte durée (quelques heures), les soins post-opératoires sont limités et la récupération est très rapide.



Chatte venant de se faire stérilisée (petite incision sur le flanc)

Les méthodes médicales (injections) sont utilisables pour une stérilisation temporaire de courte durée.

### LA CASTRATION DU CHAT

Elle est fortement recommandée. Elle est possible dès l'âge de 6 mois. L'hospitalisation est de courte durée (quelques heures).

Je reste à votre disposition pour vous conseiller  
Dr Yves BODERIOU

# LE DR BODERIOU VOUS CONSEILLE

## LA STERILISATION DE LA CHIENNE

Il est possible de stériliser les chiennes avant les premières chaleurs. La stérilisation précoce permet de réduire le risque de tumeurs mammaires, de grossesses nerveuses... Elle est recommandée en cas de diabète.

## LA STERILISATION DES FURETS

La puberté des mâles survient entre 8 et 12 mois, celle des femelles entre 7 et 10 mois. La reproduction est saisonnière (à partir de décembre – janvier). La castration des mâles permet de diminuer l'odeur corporelle et l'agressivité. La stérilisation des femelles (ovariohystérectomie) prévient l'hyperoestrogénisme (risque d'aplasie médullaire). Il est possible de stériliser les furets par la pose d'implants ce qui semble diminuer le risque de tumeurs surrénaliennes.

## LA STERILISATION DU LAPIN

La puberté est précoce : 3 mois pour la femelle, 4 mois pour le mâle. Il est conseillé de castrer les mâles vers 5-6 mois (maîtrise de la reproduction, diminution de l'agressivité et du marquage de territoire). La stérilisation chirurgicale de la lapine est possible. La diète pré-opératoire n'est pas utile (retrait des granulés le matin et foin à disposition). La réalimentation est précoce (foin au réveil).

## LA STERILISATION DES CAVIOMORPHES

L'intervention la plus pratiquée est la castration des mâles. La puberté survient à l'âge de 2 à 3 mois pour le cobaye, 9 mois pour le chinchilla mâle, 6 à 15 mois pour l'octodon.

## LA STERILISATION DES MYOMORPHES

La stérilisation chirurgicale du rat (castration) est possible. La puberté survient vers 2 mois et demi.

Je reste à votre disposition pour vous conseiller  
Dr Yves BODERIOU